

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS CUTÁNEAS DE ALERGIA

Las pruebas cutáneas de alergia por escarificación son exámenes en la piel que ayudarán a determinar si hay alguna alergia que se relacione con tus síntomas, utilizando unas pequeñas gotas de extracto de alérgenos (ácaros, polen, epitelios o alimentos de acuerdo tu caso); se realizará una punción suave en la piel, no dolorosa, y se deberá esperar 20 minutos para la lectura, no existen riesgos, y de presentarse uno mínimo, se te contará al momento de la realización de acuerdo al alérgeno que se vaya a emplear. Por ser un procedimiento médico se llenará un consentimiento informado. En caso de pruebas intradérmicas de medicamentos, hará un paso adicional donde se pondrá una pequeña cantidad medicamento muy diluido entre las capas de la piel. Para la realización de la prueba se debe suspender los medicamentos antialérgicos por 6 días. Se debe revisar la lista de medicamentos que a continuación se da (imagen), se debe tener en cuenta que si está utilizando spray nasal con azelastina también necesita suspenderse.

Si hay enfermedad grave activa como crisis de asma o infecciones se acordará realizar las pruebas después, por lo cual, se debe reprogramar la cita (3103840427, 6067469895).

MEDICAMENTOS QUE INTERFIEREN EN LAS PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA

NOMBRE GENÉRICO DEL MEDICAMENTO	PROMEDIO DE DÍAS SUPRIMIDO
Antihistamínicos de primera generación	
Clorfeniramina	2-6
Clemastina	5-10
Ciproheptadina	9-11
Dexclorfeniramina	4
Difenhidramina	2-5
Hidroxicina	5-8
Prometazina	3-5
Tripelenamina	3-7
Antihistamínicos de segunda generación	
Bilastina	2
Azelastina nasal	2
Cetirizina	3
Fexofenadina	2
Loratadina	7
Levocabastina nasal	0
Levocabastina oftálmica	0
Antidepresivos tricíclicos	
Desipramina	2
Imipramina	>10
Doxepina	6
Doxepina tópica	11
Antihistamínicos histamina 2	
Famotidina	2
Cimetidina	2
Antagonistas de cisteinil-leucotrienos	
Montelukast / Kastamon	0
Zafirlukast	0
Corticoesteroides orales	
≤ 30 mg prednisona < 1 semana	Sin supresión
>20 mg prednisona > 1 semana	Posible supresión
Corticoesteroides tópicos (potencia alta)	3 semanas en el área de aplicación
Ejemplo: Clobetasol y Betametasona Shock Anafilactico < 6 semanas Si presenta eccema generalizado en piel.	